

علائم موجود در بیماران دچار آسیب مغزی (CVA)	محدوده
<p>بیماری که دو تا یا بیشتر از علائم و نشانه های زیر را دارا باشد:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱) استقلال مددجو و خانواده بر اساس معیار ADL ۲) فقدان علائم و نشانه هایی مبنی بر بروز عوارض یا علائم بیماری حاد ۳) تعیین روش های کنترل اختلالات حسی و کلامی و فرایند های فکری تغییر یافته ۴) توانایی بلع بر اساس آزمایش کنترل بلع ۵) استقلال در انجام فعالیت های فیزیکی روزمره بر اساس ADL ۶) برخورداری از دانش و مهارت پیگیری نیازها از مجاری مرتبط در حوزه های مراقبتی، اجتماعی و معنوی 	<p>سبز</p>
<p>بیماری که دو تا یا بیشتر از علائم و نشانه های زیر را دارا باشد:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱) ناپایداری خفیف علائم حیاتی (تب، ریتم قلبی، کنترل فشار خون بر اساس نوع استروک و محدوده تعیین شده توسط پزشک) ۲) عدم توانایی در بلع طبق گفته بیمار و یا مراقب وی ۳) وجود وضعیت ناپایدار در بیماری های زمینه ای مانند دیابت ملیتوس (نیاز به تنظیم دوز داروهای کنترل قند) و وجود اختلالات تنفسی خفیف ۴) بروز اختلالات انعقادی و الکترولیتی خفیف 	<p>زرد</p>
<p>بیماری که دو تا یا بیشتر از علائم و نشانه های زیر را دارا باشد:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱) ناپایداری شدید علائم حیاتی (تب، ریتم قلبی، کنترل فشار خون بر اساس نوع استروک و محدوده تعیین شده توسط پزشک) ۲) عدم توانایی در بلع طبق گفته بیمار و یا مراقب وی ۳) وجود وضعیت ناپایدار در بیماری های زمینه ای مانند دیابت ملیتوس (تنظیم دوز داروهای کنترل قند) و وجود اختلالات تنفسی نسبتا شدید ۴) بروز اختلالات انعقادی و اختلالات الکترولیتی نسبتا شدید 	<p>قرمز</p>